

自費処方薬 金額一覧

美肌内服セット

商品名	成分名	30日分(90錠) 金額(税込)
ユベラ錠50mg	トコフェロール	1,320円
シナール配合錠	アスコルビン酸 パントテン酸	1,430円
ハイチオール錠80	L-システイン	1,320円
トラネキサム酸錠250mg 「YD」	トラネキサム酸	2,310円
美肌セット①（上記4剤）		6,000円
美肌セット②（トラネキサム酸を除く3剤）		3,800円

美肌外用薬

商品名	成分名	1本の 内容量	金額(税込)
ヒルドイドソフト軟膏0.3%	ヘパリン類似物質	25g	1,320円
ヒルドイドローション0.3%		25g	1,320円
ヘパリン類似物質ローション0.3%「日医工」		50g	880円

プラセンタ注射

商品名	成分名	数量	金額(税込)
メルスモン	胎盤絨毛分解物 (プラセンタ)	1A	1,100円
		2A	1,980円
		3A	2,860円
		4A	3,740円
		5A	4,620円

にんにく注射

商品名	成分名	数量	金額(税込)
アリナミンF50注	フルスルチアミン	1A	1,100円

男性型脱毛症（AGA）治療薬

商品名	成分名	1箱の 内容量	1箱分 金額(税込)
プロペシア錠1mg	フィナステリド	28錠	8,848円
フィナステリド錠1mg「NIG」	フィナステリド	28錠	5,712円
ザガーロカプセル0.5mg	デュタステリド	30カプセル	10,800円

勃起不全（ED）改善薬

商品名	成分名	数量	金額(税込)
パイアグラ錠25mg	シルデナフィル	1錠	1,320円

自費診療のみの場合

初診料：2,970円

再診料：550円（月1回のみ、月初の受診時に算定）

令和7年8月
パーク病院

☆薬剤詳細情報を掲載しますので適宜ご参照ください。

○ユベラ錠 50mg

ビタミンEを補給するお薬です。血行をよくする作用があります。ビタミンEは抗酸化ビタミンとしても知られ、脂肪の代謝、細胞膜の安定化、生殖や甲状腺などの機能にかかわっています。

先発医薬品です。後発医薬品はトコフェロール酢酸エステル錠です。

【効能・効果】

1. ビタミンE欠乏症の予防及び治療
 2. 末梢循環障害(間歇性跛行症、動脈硬化症、静脈血栓症、血栓性静脈炎、糖尿病性網膜症、凍瘡、四肢冷感症)
 3. 過酸化脂質の増加防止
- 1.以外の効能については、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきではない。

【用法・用量】

通常、成人には1回1～2錠(トコフェロール酢酸エステルとして50～100mg)を、1日2～3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

○シナール配合錠

アスコルビン酸(ビタミンC)とパントテン酸(ビタミンB5)を配合した複合ビタミン剤です。通常、病気、妊娠中または授乳中など、ビタミンCやビタミンB5が不足している場合の補給に用いられます。また、メラニン色素の形成を抑え、皮膚の色素沈着(シミ、ソバカスなど)の改善にも用いられます。

先発医薬品です。

【効能・効果】

本剤に含まれるビタミン類の需要が増大し、食事からの摂取が不十分な際の補給(消耗性疾患、妊産婦、授乳婦等)、炎症後の色素沈着。なお、効果がないのに月余にわたって漫然と使用すべきでない。

【用法・用量】

通常、成人には1回1～3錠を1日1～3回経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

【注意】

- ・各種の尿検査で、尿糖の検出を妨害することがある[アスコルビン酸(ビタミンC)による]。
- ・各種の尿試験紙法による尿検査(潜血、ビリルビン、亜硝酸塩)・便潜血反応検査で、偽陰性を呈することがある[アスコルビン酸(ビタミンC)による]。

○ハイチオール錠 80

アミノ酸の一種であるL-システインです。湿疹やじんま疹、にきびの治療に用いるお薬です。

後発医薬品です。

【効能・効果／用法・用量】

- ・湿疹、中毒疹、薬疹、じん麻疹、尋常性ざ瘡、多形滲出性紅斑
- 通常、成人には1回1錠(L-システインとして80mg)を1日2～3回経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。
- ・放射線障害による白血球減少症
- 通常、成人には1回2錠(L-システインとして160mg)を1日3回経口投与する。なお、年齢・症状により適宜増減する。

○トラネキサム酸錠 250mg

炎症部位のプラスミンの産生・増加を抑え、のどの痛み・腫れを改善します。

女性の肌のくすみの原因として多い肝斑（かんぱん）といわれるシミに効果的です。市販薬のトランシーノより効果的な用量でお渡ししますのでご相談ください。

後発医薬品です。先発医薬品はトランサミンです。

【効能・効果】

- ・全身性線溶亢進が関与すると考えられる出血傾向
（白血病、再生不良性貧血、紫斑病など及び手術中・術後の異常出血）
- ・局所線溶亢進が関与すると考えられる異常出血
（肺出血、鼻出血、性器出血、腎出血、前立腺手術中・術後の異常出血）
- ・下記疾患における紅斑・腫脹・そう痒などの症状
湿疹及びその類症、蕁麻疹、薬疹・中毒疹
- ・下記疾患における咽頭痛・発赤・充血・腫脹などの症状
扁桃炎、咽喉頭炎
- ・口内炎における口内痛及び口内粘膜アフター

【用法・用量】

通常、成人には1日3～8錠（トラネキサム酸として750～2,000mg）を3～4回に分割経口投与する。なお、年齢、症状により適宜増減する。

○ヒルドイドソフト軟膏 0.3%

皮膚の乾燥を防ぎ、血行をよくする軟膏タイプの塗り薬です。

皮膚のかさつき、しもやけ、角皮症などに有効です。アトピー性皮膚炎のスキンケアに用いることもあります。

先発医薬品です。後発医薬品はヘパリン類似物質油性クリームです。

【市販薬との比較】

市販品の『ヒルマイルド』（60g 1,705円）と同じ成分の薬です。

【効能・効果】

血栓性静脈炎(痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結並びに疼痛)、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸(乳児期)

【用法・用量】

通常、1日1～数回適量を患部に塗擦又はガーゼ等にのばして貼付する。

○ヒルドイドローション 0.3%

皮膚の乾燥を防ぎ、血行をよくするローションタイプの塗り薬です。

皮膚のかさつき、しもやけ、角皮症などに有効です。アトピー性皮膚炎のスキンケアに用いることもあります。先発医薬品です。

後発医薬品はヘパリン類似物質ローションです。

【効能・効果】

血栓性静脈炎(痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結並びに疼痛)、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸(乳児期)

【用法・用量】

通常、1日1～数回適量を患部に塗布する。

○ヘパリン類似物質ローション 0.3%

皮膚の乾燥を防ぎ、血行をよくするローションタイプの塗り薬です。

皮膚のかさつき、しもやけ、角皮症などに有効です。アトピー性皮膚炎のスキンケアに用いることもあります。後発医薬品です。

先発医薬品はヒルドイドローションです。

【効能・効果】

血栓性静脈炎(痔核を含む)、血行障害に基づく疼痛と炎症性疾患(注射後の硬結並びに疼痛)、凍瘡、肥厚性瘢痕・ケロイドの治療と予防、進行性指掌角皮症、皮脂欠乏症、外傷(打撲、捻挫、挫傷)後の腫脹・血腫・腱鞘炎・筋肉痛・関節炎、筋性斜頸(乳児期)

【用法・用量】

通常、1日1～数回適量を患部に塗布する。

○メルスモン（プラセンタ注射）

プラセンタは、長い歴史をもつ成分であり、メルスモンは更年期障害や乳汁分泌不全の保険適応薬として、日本でも信頼度の高い製剤です。

美肌はもちろん、プレ更年期や更年期世代の慢性疲労・肩こり・イライラ・落ち込み、花粉症・アトピー性皮膚炎の症状緩和などに適応します。抗アレルギー内服薬とは異なり、プラセンタは、漢方と同様に根本的な体質改善に寄与します。

更に、肝機能が良くなり、二日酔いになりづらくなる肝機能障害や二日酔いのお悩みにもおすすめです。

健康維持目的には週1回、アトピー症状が強い方は週2-3回、花粉症の緩和には年末頃から週1回程度の投与をおすすめしています。

【効能・効果】

更年期障害、乳汁分泌不全

【用法・用量】

通常、1日1回2mLを毎日又は隔日に皮下注射する。

【副作用について】

皮下注射では重篤な副作用が起こることはほとんどありませんが、たまに「悪寒、悪心、発熱、発赤、発疹」などの反応が起こることがあり、この場合はすぐに投与を中止します。また、注射部位に「疼痛、発赤」などの副作用が起こることもありますが、これらは半日程度で消えることがほとんどです。他にも、プラセンタ注射薬が「たん白アミノ酸製剤」であるためアレルギー反応が起きたり、閉経後の月経再開がみられることもまれにありますが、すぐに投与を中止すれば治ります。